

Behandling af indvendige hæmorider ved elastikmetoden

En indvendig hæmoride er en frembuling ind i den nederste del af endetarmen af en blodåre og den slimhinde, der ligger oven på åren.

Før behandlingen

De vil blive bedt om at tage et klyx (Mikrolax) en time før, De forlader hjemmet.

Behandlingen

Da der ikke er smertesans på indersiden af tarmen, foretages behandlingen uden bedøvelse. Ved elastikmetoden sættes en lille og meget stram elastik hen over hæmorroiden/frembulingen. Herved stoppes blodforsyningen til hæmoriden, som derefter ”visner” og falder af sammen med elastikken.

Efter behandlingen

Der kan det første halve til hele døgn føles stramning og afføringstrang. Hvis det generer, kan man tage et smertestillende håndkøbspræparat, Paracetamol, Kodymagnyl eller eventuelt Ibuprofen.

Restriktioner: Der er ingen forholdsregler efter operationen, og man kan gå normalt på toilettet.

Efter 8-10 dage vil den afsnørede hæmorroide falde af og forsvinde sammen med afføringen. Dette observeres normalt ikke, men kan en sjælden gang medføre en smule blod i afføringen.

Komplikationer

Yderst sjældent kan der fra 2-10 dage efter behandlingen opstå kraftig blødning fra tarmen, ligesom der kan optræde kraftige smerter i tarmen ledsaget af feber. I sjældne tilfælde kan man føle sig lidt utilpas.

Søg læge: Ved kraftig blødning, smerter eller feber bør man kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue.

I yderst sjældne tilfælde er der risiko for forsnævring og inkontinens efter operationen.

Kirurgisk Klinik Horsens tlf. 75615777 mandag-torsdag 09.00-12.00

www.kirurgi-horsens.dk

Vedrørende privatlivspolitik/informationspligt kan det læses på vores hjemmeside.

Kirurgisk klinik 14.08.2019 godkendt/rev. 14.08.2022 CH/HM