

Frenulum breve (stramt bånd på undersiden af penis)

Vi anbefaler, at man tager en cocktail af 1 Ibuprofen 600 mg og 2 Pamol 500 mg ca. 1 time før operationen.

Man kan med fordel smøre lokalbedøvende creme (EMLA) omkring selve operationsområdet (båndet).

Operationen foregår i lokalbedøvelse med anlæggelse af bedøvelse i selve båndet på penis. Når bedøvelsen er lagt gennemskæres det stramme bånd med CO2 laser. Der pålægges lille forbindelse som kan fjernes ved vandladning. Eventuelt sys blødende kar med tråd, der forsvinder af sig selv.

Hele indgrebet varer ca. 15 minutter. Der kan ved behov anvendes smertestillende medicin som f.eks. Pamol eller Kodimagnyl. Du anbefales at forholde dig i ro et par dage efter operationen og undgå fysisk anstrengelse herunder motion.

Det er vigtigt at trække forhuden tilbage fra 2. dagen efter operationen, så området ikke gror sammen igen.

Såret heler i løbet af 4-6 dage og seksuel aktivitet bør vente til såret er helet op.

Der ses sjældent komplikationer. Ved større blødning eller tegn på betændelse kan klinikken eller vagtlæge kontaktes.

Kirurgisk klinik Horsens tlf.75615777 mandag-torsdag 09.00-1200

www.kirurgi-horsens.dk

Vedrørende privatlivspolitik/informationspligt kan det læses på vores hjemmeside

Kirurgisk klinik 14.08.2019 godkendt/rev. 14.08.2022 CH/HM