

# Operation af hæmorider/marisker omkring endetarmsåbningen

Hæmorider er en udvidelse af blodårer i endetarmsåbningen. Der kan dannes løs hud (marisker) efter hæmorider . Ved operation kan de generende hæmorider/marisker fjernes.

## Før operationen

Vi anbefaler, at man tager en cocktail af 1 Ibuprofen 600 mg og 2 Pamol 500 mg ca. 1 time før operationen. Man kan med fordel smøre lokalbedøvende creme (EMLA) omkring endetarmen 1-2 timer før operationen. **Man skal arrangere hjemtransport** og vi anbefaler at man er sygemeldt ca. 3 dage efter operationen pga. smerter. Det er vigtigt at forholde sig i ro. De skal ikke udtømmes inden indgrebet. Hvis du får blodfortyndende medicin bedes De oplyse dette.

## Operationen

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik i selve hæmoriden eller i omgivelserne til endetarmsåbningen. Indgrebet varer ca. ½ time.

## Efter operationen

De første 2-3 dage efter nogle operationer er smertefulde, hvorfor man medfordel vil kunne blødgøre afføringen for at lette passagen igennem operationssåret ved at spise fiberrigt og drikke rigeligt. Mod smerter kan tages Pamol, Kodimagnyl eller Ibuprofen, med mindre andet er aftalt.

Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange daglig og efter toiletbesøg, indtil operationsområdet er smertefrit. Eventuelt kan kolde omslag anvendes (kuldepakning, kolde ærter i stofbetræk) både for at standse blødning og reducere smerter. Der skal ikke fjernes sting.

Som regel aftales kontrol 6-8 uger efter operationen. Det fjernede væv vil blive sendt til mikroskopi, og 4-6 uger efter operation vil De få svar på dette enten pr. email eller telefon. Svaret vil også blive sendt til Deres læge. Ved svar som kræver videre behandling vil De blive kontaktet.

## Komplikationer

Lettere blødning kan forekomme. Infektion er yderst sjældent.

**Søg læge:** Ved større blødning, eller tegn på betændelse skal klinikken, vagtlægen eller skadestuen straks kontaktes.

I yderst sjældne tilfælde er der risiko for forsnævring og inkontinens efter operationen.

Du er velkommen til at kontakte klinikken ved tvivlspørgsmål. Kirurgisk Klinik Horsens

Tlf. 75615777 mandag-torsdag 09.00-12.00 [www.kirurgi-horsens.dk](http://www.kirurgi-horsens.dk)

Vedrørende privatlivspolitik/informationspligt kan det læses på vores hjemmeside.

Kirurgisk klinik 14.08.2019 godkendt/rev. 14.08.2022 CH/HM