

Vejledning vedr. laserbehandling.

De første dage efter behandlingen med laser vil såret væske, og i den tid kan det smøres 2 gange dagligt med Klorhexidin creme eller Klorhexidin isotonisk opløsning (mundskyllevæske).

Det anbefales at anvende plaster.

Så snart såret er tørt og skorpedækket skal behandlingen ophøre, og man skal lade såret være i fred.

Efter ca. 14 dage vil skorpen være afstødt og der vil være en rød, tynd hud, som i løbet af 4-6 uger vil normaliseres sig. Der kan komme en hvid plet som i de fleste tilfælde vil forsvinde i løbet af 3-6 mdr. Ardannelse vil være minimal.

Det vil være en god ide at beskytte området med en solblokker når det er helet op.

Såfremt der er taget vævsprøver, vil De få svaret enten pr. email eller telefon. Svaret vil også blive sendt til Deres læge. Ved svar som kræver videre behandling, vil De blive kontaktet.

De vil være frisk efter behandlingen

Der er normalt ikke komplikationer, men ved f.eks. betændelse eller blødning kan De kontakte klinikken eller søge vagtlæge/skadestue.

Kirurgisk klinik Horsens tlf. 75615777 mandag-torsdag 09.00-12.00

www.kirurgi-horsens.dk

Vedrørende privatlivspolitik/informationspligt kan det læses på vores hjemmeside.